

### **ΘΕΜΑ 1ο**

- 1.1.** Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Η σταθερά  $K_w$  στους 25° C έχει τιμή  $10^{-14}$ :

- α.** μόνο στο καθαρό νερό
- β.** σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυμα
- γ.** μόνο σε υδατικά διαλύματα βάσεων
- δ.** μόνο σε υδατικά διαλύματα οξέων.

*Μονάδες 4*

- 1.2.** Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας την παρακάτω χημική εξίσωση:




*Μονάδες 4*

- 1.3.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη **Σωστό** ή **Λάθος** δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

- α.** Τα καρβοξυλικά οξέα ( $\text{RCOOH}$ ) αντιδρούν με ανθρακικά άλατα.
- β.** Η ένωση με τύπο  $\text{RC}\equiv\text{N}$  ανήκει στις αμίνες.
- γ.** Τα αντιδραστήρια Grignard αντιδρούν με  $\text{HCH}=\text{O}$  και μετά από υδρόλυση του ενδιάμεσου προϊόντος, δίνουν δευτεροταγή αλκοόλη.
- δ.** Οι αμίνες αντιδρούν με το  $\text{HCl}$  και δίνουν τα αντίστοιχα άλατα .
- ε.** Τα αλκυλαλογονίδια αντιδρούν με αλκοξείδια του νατρίου ( $\text{RONa}$ ) και δίνουν αιθέρες.

*Μονάδες 5*

- 1.4.** Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω χημική εξίσωση, προσδιορίζοντας το συντακτικό τύπο της οργανικής ένωσης που αναφέρεται καθώς και την ανόργανη ουσία που αντιστοιχεί στο γράμμα X.



*Μονάδες 4*

- 1.5.** Η προσθήκη  $\text{HCN}$  στις καρβονυλικές ενώσεις του τύπου  $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$  δίνει **δύο** οργανικά προϊόντα.

Να γράφουν οι σχετικές χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων, χρησιμοποιώντας τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων.

*Μονάδες 8*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Η λύση του θέματος θα είναι διαθέσιμη σύντομα

### **ΘΕΜΑ 2ο**

100mL διαλύματος  $\Delta_1$  που περιέχει  $\text{NH}_3$  ογκομετρούνται με διάλυμα  $\text{HNO}_3$  0.2M παρουσία κατάλληλου δείκτη.

Για την πλήρη εξουδετέρωση της  $\text{NH}_3$  απαιτούνται 50mL διαλύματος  $\text{HNO}_3$ , οπότε προκύπτει τελικό διάλυμα  $\Delta_2$ .

- α.** Να γράψετε την εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται, και να εξετάσετε, αν το διάλυμα  $\Delta_2$ , είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο, γράφοντας τη χημική εξίσωση της ισορροπίας που αποκαθίσταται σε αυτό.

*Μονάδες 6*

- β.** Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση σε  $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$  του αρχικού διαλύματος  $\Delta_1$  σε  $\text{NH}_3$ , καθώς και το pH αυτού.

*Μονάδες 6*

- γ.ι.** Να υπολογίσετε την τιμή του pH του διαλύματος που προκύπτει μετά την προσθήκη 25 mL διαλύματος  $\text{HNO}_3$  0.2M, στα 100mL του διαλύματος  $\Delta_1$ .

*Μονάδες 8*

- ii.** Να βρεθεί το χρώμα που θα έχει τότε το διάλυμα, αν δίνονται ότι:

- ο δείκτης είναι ένα ασθενές μονοπρωτικό οξύ  $\text{H}\Delta$ .
- το χρώμα των μορίων του δείκτη  $\text{H}\Delta$  είναι κόκκινο και επικρατεί όταν 
$$\frac{[\text{H}\Delta]}{[\Delta^-]} \geq 10$$
- το χρώμα των ιόντων  $\Delta^-$  του δείκτη είναι κίτρινο και επικρατεί όταν 
$$\frac{[\Delta^-]}{[\text{H}\Delta]} \geq 10$$

*Μονάδες 5*

Δίνονται ότι όλα τα διαλύματα είναι υδατικά, στους  $25^\circ \text{C}$  και  $K_b(\text{NH}_3) = 10^{-5}$ ,  $K_a(\text{H}\Delta) = 10^{-5}$ ,  $K_w = 10^{-14}$ .

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Η λύση του θέματος θα είναι διαθέσιμη σύντομα

### **ΘΕΜΑ 3ο**

- 3.1.** Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση συμπληρωμένη με τις σωστές λέξεις:

Η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη είναι ..... πεπτιδικής φύσεως, που εκκρίνονται από το ..... και ρυθμίζουν τη συγκέντρωση του σακχάρου στο αίμα.

Μονάδες 4

**3.2.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της **Στήλης I** και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της **Στήλης II** που αντιστοιχεί στη σωστή έννοια.

Στήλη I	Στήλη II
A. Ουρακίλη	1. Πεντόζη του DNA
B. D-ριβόζη	2. Αζωτούχος βάση του RNA
Γ. Δεοξυριβονουκλεοτίδιο	3. Μονομερές του DNA
Δ. Ριβονουκλεοτίδιο	4. Πεντόζη του RNA
	5. Μονομερές του RNA

Μονάδες 4

**3.3.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη **Σωστό** ή **Λάθος** δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

- α.** Όταν το pH υδατικού διαλύματος ενός αμινοξέος είναι  $pH < pI$ , τότε το αμινοξύ εμφανίζεται θετικά φορτισμένο.
- β.** Το μόριο της γλυκόζης αποτελεί τη δομική μονάδα του αμύλου, της κυτταρίνης και του γλυκογόνου.
- γ.** Η αλληλουχία των αντιδράσεων της γλυκόλυσης είναι διαφορετική για τους αερόβιους και τους αναερόβιους οργανισμούς.

Μονάδες 6

**3.4.** Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Το υπόστρωμα προσδένεται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου

- α.** με ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, δεσμούς υδρογόνου και δυνάμεις Van der Waals
- β.** με ομοιοπολικούς δεσμούς
- γ.** μόνο με δεσμούς υδρογόνου
- δ.** με δισουλφιδικούς δεσμούς.

Μονάδες 3

**3.5.** Η ταχύτητα μιας ενζυμικής αντίδρασης ελαττώνεται, όταν το pH είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από την άριστη τιμή. Να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό.

Μονάδες 8

## ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Η λύση του θέματος θα είναι διαθέσιμη σύντομα

### ΘΕΜΑ 4ο

- 4.1.** Κατά την υδρόλυση ενός τετραπεπτιδίου με διάλυμα HCl, προκύπτουν δύο μόρια γλυκίνης (Gly) και δύο μόρια αλανίνης (Ala). Χρησιμοποιώντας τα σύμβολα Gly και Ala, να γράψετε την αλληλουχία των αμινοξέων κάθε πιθανού τετραπεπτιδίου.

Μονάδες 6

- 4.2.** Η μεταβολική πορεία που ακολουθεί το κύτταρο για την πλήρη οξειδωση της γλυκόζης, απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:



Να γράψετε στο τετράδιό σας κάθε αριθμό του σχήματος και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

- A.** ακέτυλο CoA
- B.** CO<sub>2</sub>
- Γ.** ATP
- Δ.** Πυροσταφυλικό οξύ
- Ε.** NADH και FADH<sub>2</sub>

Μονάδες 10

**4.3.** Το ένζυμο κλειδί για τη ρύθμιση της γλυκόλυσης είναι η φωσφοφρουκτοκινάση

**α.** Να αναφέρετε την αντίδραση που καταλύει

*Μονάδες 3*

**β.** Με ποιο τρόπο ρυθμίζεται η γλυκολυτική πορεία από το ένζυμο αυτό σύμφωνα με την ενεργειακή κατάσταση του κυττάρου.

*Μονάδες 6*

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Η λύση του θέματος θα είναι διαθέσιμη σύντομα